

| | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Carattere: | Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina superiore del lembo | Codes N° OIV 070 |
| Caractère: | Feuille adulte: distribution de la pigmentation anthocyane des nervures principales de la face supérieure du limbe | |
| Merkmal: | Ausgewachsenes Blatt: Bereich der Anthocyanfärbung der Hauptnerven auf der Oberseite der Spreite | |
| Characteristic: | Mature leaf: area of anthocyanin coloration of main veins on upper side of blade | |
| Carácter: | Hoja adulta: distribución de la pigmentación antociánica de los nervios principales del haz del limbo | |

| Livelli di espressione / Notation / Bonitierung / Notes / Notación: | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 assente | 2 solo al punto peziolare | 3 fino alla 1 ^a biforcazione | 4 fino alla 2 ^a biforcazione | 5 oltre la 2 ^a biforcazione |
| nulle | seulement au point pétioinaire | jusqu'à la 1 ^{ère} bifurcation | jusqu'à la 2 ^{ème} bifurcation | au-delà de la 2 ^{ème} bifurcation |
| fehlend | nur Stielansatz | bis zur 1. Adernverzweigung | bis zur 2. Adernverzweigung | über 2. Adernverzweigung hinaus |
| absent nula | only at the petiolar point punto peciolar | up to the 1 st bifurcation | up to the 2 nd bifurcation | beyond the 2 nd bifurcation por encima de la segunda bifurcación |

| Varietà di riferimento / Exemples de variétés / Beispieldsorten / Example varieties / Ejemplos de variedades: | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1 Dattier de Beyrouth B | 2 Muscat of Garnacha tinta N Isabella N | 3 Palomino Fino B Rkatsiteli B | 4 Primitivo N | 5 Veltliner Frührot Rg Chenin B |

| Indicazioni / Définitions / Definitionen / Definitions / Indicaciones: | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| I: | Osservazione da effettuare tra l'allegagione e l'invaiatura su almeno 10 foglie adulte del terzo mediano di parecchi germogli. Rilevare la distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali N ₁ - N ₃ . | | | |
| F: | Observation à faire entre la nouaison et la véraison sur au moins 10 feuilles adultes du tiers médian de plusieurs rameaux. Notation de la distribution de la pigmentation anthocyane sur les nervures principales N ₁ - N ₃ . | | | |
| D: | Feststellung vom Beerenansatz bis zum Weichwerden der Beeren. Beurteilung von mindestens 10 ausgewachsenen Blättern am mittleren Drittel mehrerer Triebe. Beurteilt wird die Verteilung der Anthocyanfärbung auf den Hauptnerven N ₁ - N ₃ . | | | |
| E: | Observation from berry set to veraison. Notation on at least 10 mature leaves from the middle third of several shoots. The distribution of anthocyanin coloration on the main veins N ₁ - N ₃ has to be assessed. | | | |
| S: | Observación a realizar entre el cuajado y el envero sobre al menos 10 hojas adultas en el tercio medio de varios pámpanos. Notación de la distribución de la pigmentación antociánica sobre los nervios principales N ₁ - N ₃ . | | | |

